

Szkodniki występujące na działkach

- Gryzonie:** za najczęściej spotykany gatunek na działkach i w ogrodach uważa się nornicę. Natomiast najczęściej spotykanym i najbardziej szkodliwym gatunkiem jest nornik polny, odznaczający się niezwykłą płodnością i rozwojem trwającym nieprzerwanie przez cały rok. Obok nornika polnego na działkach spotkać można nornika burego, karczownika ziemnowodnego oraz myszy.
- Kret:** zaliczany do owadożernych jest zwierzęciem chronionym poza działkami i ogrodami. W powszechnej opinii kret tępi owady żyjące w glebie / pędraki, drutowce / Tymczasem ponad 90 % pokarmu kreta stanowią dżdżownice, które wyłapuje podczas bezustannych wędrówek wzdłuż tuneli wygrzebanych w glebie.
- Mrówki:** w powszechnej opinii uważane są za pożyteczne owady. Tymczasem na działce czy w ogrodzie mogą się stać uciążliwymi szkodnikami trawników lub spełniać inną, małą znaną rolę. Kiedy widzimy mrówki wędrujące po pniu drzewa to znak, że gdzieś powyżej, w koronie drzewa znajduje się kolonia mszyc.
- Mszyce:** to owady, które fascynują niespotykaną u innych zwierząt płodnością i zwyczajami występującymi wyłącznie u tej grupy organizmów. Zdarza się, że pozornie z niczego, w ciągu kilku tygodni dochodzi do szybkiego rozmnożenia mszyc, których kolonie pokrywają grubą warstwą powierzchnię liści czy pędów.
- Owocnice i owocówki:** te dwie nazwy często są mylone przez działkowców, a przecież dotyczą dwóch całkowicie różnych grup szkodników. Owocnice / jabłkowa, gruszowa, żółtoroga, jasna /, to błonkówki, latające w okresie kwitnienia jabłoni, gruszy czy śliw. Jaja zawsze składają do kwiatów, a ich larwy uszkadzają zawiązki owoców, które następnie opadają na ziemię. Owocówki to motyle wylatujące później od owocnic i uszkadzają większe zawiązki / w przypadku jabłoni wielkości orzecha włoskiego. Ponadto owocówki mają dwa pokolenia, toteż ich gąsienice / np. owocówki śliwkóweczki / mogą w poważnym stopniu uszkodzić dojrzewające owoce. Okresy zwalczania tych szkodników są różne; owocnice zwalczamy zaraz po kwitnieniu, podczas gdy owocówki później.
- Przędziorki:** to niewielkie / 0,5 mm / pajęczaki, atakujące wiele różnych gatunków roślin. Najczęściej spotykany jest przędziorek chmielowiec, a lista jego roślin żywicielskich liczy kilkaset gatunków. Spotykany jest zarówno w szklarniach i tunelach foliowych, jak i na drzewach owocowych oraz truskawkach.
- Stonka ziemniaczana:** piękny a zarazem groźny owad znany każdemu od dziecka. Na działkach stonka pojawia się często, zwłaszcza na bakłazanach, których liście potrafi zjeść całkowicie. Spotykana jest również na pomidorach, które jednak nie stanowią dla larw stonki wartościowego pokarmu i

powodują ich wysoką śmiertelność w najwcześniejszych stadiach rozwoju.

Szpeciele: to niewidoczne gołym okiem pajęczaki, o długości ciała sięgającej 0,2 mm
Żyją wewnątrz tkanek lub narządów roślinnych, wysysając soki i powodując zniekształcenia.

Ślimaki: to prawdziwe utrapienie zwłaszcza starych, wilgotnych ocienionych działek
Żerują nocą, w ciągu dnia pozostając w wilgotnych miejscach, gdzie nie grozi im wyschnięcie. Lśniące, białe jaja składają po kilkanaście sztuk do gleby.

Literatura:

1. Ochrona roślin na działkach. Kazimierz Wiech. str. 75 – 90.
2. Najlepsze rady dziadka ogrodnika. Susanne Bruns, Joachim Stammer. Str. 83 – 101.